

داروی داکسی سایکلین در چه مواردی مصرف می شود؟

- ✓ برای درمان آکنه
- ✓ برای درمان یا پیشگیری از عفونت های باکتریایی
- ✓ برای پیشگیری از مالاریا
- ✓ برای درمان تورم بافت اطراف دندان
- ✓ برای درمان آکنه روزاسه

قبل از مصرف این دارو چه مواردی را باید به پزشک خود بگویید؟

- ✓ اگر به دارویی حساسیت دارید.
- ✓ اگر داروی دیگری را مصرف می کنید؛ مانند آسپرین، ایزوترتینوئین، پنی سیلین.

مواردی که باید هنگام مصرف این دارو بدانید یا انجام دهید:

- ✓ در صورت مصرف این دارو باید به پزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار خود اطلاع دهید.
- ✓ این دارو ممکن است روی برخی آزمایشات تاثیر بگذارد.
- ✓ بیشتر از مدت زمان مشخص شده این دارو را مصرف نکنید؛ ممکن است عفونت ثانویه رخ دهد.
- ✓ اگر به سولفیت حساسیت دارید، با پزشک خود مشورت کنید زیرا برخی محصولات دارای سولفیت هستند.
- ✓ این دارو ممکن است به راحتی باعث سوختگی شما شود. اگر معمولاً زیر نور آفتاب قرار می گیرید از آن مراقبت کنید. اگر با مصرف این دارو به راحتی دچار آفتاب سوختگی می شوید، به پزشک خود اطلاع دهید.
- ✓ با مصرف این دارو ممکن است یک واکنش پوستی شدید (سندروم استیون-جانسون/ نکرور اپیدرم سمی) رخ دهد که سلامتی شما را به خطر بیندازد و حتی می تواند باعث مرگ شود. در صورت مشاهده علائم زیر حتماً به پزشک مراجعه کنید:

- قرمزی، تورم، تاول و پوسته پوسته شدن پوست (همراه/ بدون تب)

- قرمزی یا تحریک در چشم

- زخم در دهان، گلو، بینی یا چشم

- ✓ با مصرف این دارو، قرص های ضدبارداری و سایر دارو های هورمونی ضدبارداری ممکن است اثربخشی خوبی نداشته باشند لذا هنگام مصرف این دارو از موارد دیگر برای پیشگیری از بارداری مانند کاندوم استفاده کنید.
- ✓ مصرف این دارو در کودکان زیر ۸ سال یا در نوزادان متولد شده از خانم های بارداری که این دارو را مصرف کرده اند می تواند باعث تغییر رنگ غیر قابل برگشت دندان ها به قهوه ای مایل به خاکستری یا تغییرات دیگری در دندان ها شود. همچنین می تواند در رشد استخوان ها اثر بگذارد.
- ✓ معمولاً این دارو در کودکان زیر ۸ سال مصرف نمی شود با این حال ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که نیاز به مصرف این دارو داشته باشند.
- ✓ تغییر رنگ دندان در بزرگسالان نیز رخ داده است که پس از قطع این دارو و تمیز کردن دندان ها در دندانپزشکی به حالت طبیعی خود برگشته است.
- ✓ مصرف این دارو در بارداری باعث آسیب به جنین می شود. اگر باردار هستید و یا حین مصرف این دارو باردار شوید، بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.
- ✓ در صورت شیردهی با پزشک خود مشورت کنید.

در مورد کدام عوارض جانبی باید بلافاصله به پزشک خود

مراجعه کنید؟

- ✗ علائم واکنش آلرژیک مانند بثورات جلدی، خارش، قرمزی، تورم، تاول پوستی و پوسته پوسته شدن پوست همراه/ بدون تب، خس خس سینه، تنگی

نفس، مشکل در تنفس یا بلع یا صحبت کردن، گرفتگی صدا، تورم در دهان، صورت، لب ها، زبان یا گلو.

- ✗ علائم مشکلات کبدی مانند تیره شدن ادرار، احساس خستگی، عدم گرسنگی، درد شکم، مدفوع روشن، استفراغ، پوست یا چشم های زرد رنگ.
- ✗ علائم مشکلات لوزالمعده مثل درد شدید شکم، درد شدید پشت، استفراغ.
- ✗ درد یا فشار در قفسه سینه یا تند شدن ضربان قلب.
- ✗ تغییر در میزان ادرار
- ✗ تب، لرز یا گلودرد، هرگونه کبودی یا خونریزی غیرقابل توجیه، احساس خستگی یا ضعف شدید
- ✗ تحریک گلو
- ✗ مشکل در بلع
- ✗ درد عضلانی یا مفصلی
- ✗ تنفس سریع
- ✗ گرگرفتگی
- ✗ سرگیجه شدید یا از حال رفتن
- ✗ تغییر در رنگ پوست
- ✗ غدد متورم
- ✗ خارش یا ترشحات از واژن

اسهال به دنبال آنتی بیوتیک ها نرمال است. یک شکل نادر از اسهال ممکن است رخ دهد که گاهی می تواند باعث کولیت کشنده شود. این عارضه ممکن است طی مصرف یا چند ماه بعد مصرف آنتی بیوتیک رخ دهد. در صورت بروز درد معده، درد های شکمی، مدفوع آبکی و شل



مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

آموزش به بیمار داروی «داکسی سایکلین»



گروه هدف: بیماران مرکز

تهیه کننده: دکتر الناز شاسب، داروساز بالینی

ویراستار: اصغری خاتونی، سوپروایزر سلامت

واحد آموزش سلامت بیمار، خانواده

تدوین: زمستان ۱۳۹۹

بازنگری: زمستان ۱۴۰۰

- ❖ اگر نزدیک نوبت بعدی به یاد بیاورید، بهتر است از دوز فراموش شده صرف نظر نکنید و دوز بعدی را سر وقت مصرف کنید.
- ❖ دو دوز را همزمان مصرف نکنید.

چگونه این دارو را باید نگهداری کنید؟

- در دمای اتاق به دور از نور و در جای خشک نگهداری شود.
- اگر تاریخ انقضای دارو گذشته باشد از مصرف آن صرف نظر کنید.

به دور از دسترس کودکان نگه داشته شود.



جزوات آموزش به بیمار به آدرس زیر
<https://alzahrahosp.tbzmed.ac.ir/>
منوی آموزش به بیمار، قابل دسترسی است

- ❌ یا خونی حتما به پزشک خود اطلاع دهید. قبل از درمان اسهال حتما با پزشک خود مشورت کنید.
- ❌ افزایش فشار مغزی با این دارو گزارش شده است که معمولا با قطع دارو به حالت طبیعی برمی گردد. گاهی ممکن است کاهش بینایی رخ دهد و حتی با قطع دارو نیز از بین نرود. در صورت سردرد یا مشکلات بینایی مثل تاری دید، دوبینی و یا کاهش بینایی بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

برخی از عوارض جانبی دیگر داروی داکسی سایکلین چیست؟

- ❌ اسهال، ناراحتی معده، استفراغ
- ❌ عدم احساس گرسنگی

این دارو بهتر است چگونه مصرف شود؟

- ✓ این دارو را همانطور که پزشک تجویز کرده مصرف کنید حتی اگر احساس می کنید بهتر شده اید.
- ✓ بهتر است از مصرف همزمان این دارو با لبنیات و شیر و سایر محصولات دارای کلسیم خودداری کنید تا اثربخشی مناسبی داشته باشد.
- ✓ بهتر است با این دارو مقدار فراوانی آب بنوشید
- ✓ طی دو ساعت از مصرف این دارو، از مصرف بیسموت، کلسیم، آهن، منیزیم، زینک، مولتی ویتامین دارای مواد معدنی، کلسیپول، کلسیرامین، دیدانوزین، آنتاسید ها پرهیز کنید.
- ✓ طی نیم ساعت بعد مصرف این دارو دراز نکشید.

اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، باید چکار کنید؟

- ❖ به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف کنید.