

این دارو چه استفاده هایی دارد؟

این دارو برای کاهش ریسک خطر حمله قلبی و سکته تجویز شده است.
برای آگاهی از هرگونه علت تجویز دیگر با پزشک خود مشورت کنید.

نکاتی که باید با پزشک یا داروساز در میان گذاشت:

آلرژی به دارو
خونریزی فعال (خونریزی در مغز یا سایر خونریزی ها)
در صورت مصرف همزمان اس امپرازول و امپرازول (کاهش اثر کلوپیدگرویل با مهار آنزیم cyp2c19 که مسئول تشکیل متابولیت فعال کلوپیدگرویل است) و رپاگلیناید (مهار آنزیم cyp2c8 توسط کلوپیدگرویل که باعث افزایش اثر رپاگلیناید می شود)
اطلاع به پزشک یا داروساز در صورت ضربه دیدن یا افتادن
استفاده از مسواک نرم (به دلیل ریسک خونریزی بالا)
احتیاط در مصرف همزمان آسپرین، قرص سیر، جینسنگ، جینکوبلوبا، ایبوپروفن و ویتامین E

عوارض جانبی دارو:

راش، خارش، قرمزی پوست، تنگی نفس،
ادم لب، زبان و گلو
علائم خونریزی مانند سرفه خونی، خونریزی در ادرار، استفراغ خونی، مدفوع تیره و یا خونی، خونریزی لثه، خونریزی واژینال
علائم هایپوگلیسمی مانند سرگیجه،
خستگی، خواب آلودگی، ضعف، گیجی،
گرسنگی

عارضه جدی thrombotic
thrombocytopenic purpura (ttp)
اطلاع به داروساز در صورت مشاهده علائمی
مانند: گیجی، خستگی، ضعف در یک نیمه
بدن، سختی در صحبت، افتادگی یک نیمه از
صورت، تپش قلب، تب، کاهش ادرار، نقاط
بنفش روی پوست تشنج

نحوه مصرف دارو

استفاده با غذا یا بدون غذا
در صورت فراموشی یک دوز از دارو
بلافاصله بعد از یادآوری دوز فراموش
شده استفاده شود، اگر زمان کمی تا
دوز بعدی دارو مانده است دوز
فراموش شده را استفاده نکرده و دوز
بعدی طبق برنامه استفاده شود (هرگز
دو دوز با هم استفاده نشود). دارو در
دمای اتاق، به دور از نور و رطوبت نگه
داری شود.



مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

آموزش به بیمار داروی کلوپیدگرویل



گروه هدف: بیماران مرکز

تهیه کننده: دکتر الناز شاسب، داروساز بالینی

ویراستار: اصغری خاتونی سوپروایزر سلامت

واحد آموزشی سلامت بیمار، خانواده

تدوین: زمستان ۱۳۹۹

بازنگری: زمستان ۱۴۰۰

جزوات آموزش به بیمار به آدرس زیر
<https://alzahrahosp.tbzmed.ac.ir/>
منوی آموزش به بیمار قابل دسترسی است

