

این دارو چه استفاده هایی دارد ؟

فشار خون

نکاتی که قبل از مصرف باید با پزشک یا داروساز در میان گذاشت :

داشتن آلرژی به این دارو

سابقه بیماری کبدی

استفاده از داروهای مورد استفاده در افسردگی و پارکینسون (مانند ترانیل سیپرومین، سلژلین، راساژلین) در ۱۴ روز گذشته که ریسک فشار خون بسیار بالا را در پی دارد.

مصرف همزمان قرص های آهن که کاهش جذب متیل دوپا را در پی دارد.

نکات قابل توجه حین مصرف این دارو :

احتیاط در رانندگی و کارهای حساس

عدم تغییر ناگهانی موقعیت بدن از خوابیده به

ایستاده (ریسک افت فشار)

امکان تاثیر در برخی تست های آزمایشگاهی

مشورت با پزشک یا داروساز برای استفاده همزمان از

محصولات OTC که فشار خون را بالا می برند (مانند

محصولات ضد سرفه و ضد سرماخوردگی، محرک

ها، قرص های لاغری، ایبوپروفن و...)

دو عارضه نادر و مهم دارو : آنمی همولیتیک و مشکلات کبدی

احتیاط در مصرف الکل

علائمی که با مشاهده آن ها باید بلافاصله به پزشک یا داروساز اطلاع داد:

علائم واکنش آلرژیک به دارو مانند جوش، خارش و

قرمزی بدن، سرفه، تنگی نفس، ادم گلو و صورت و لب ها

علائم کبدی مانند ادرار تیره، خستگی مفرط، درد

شکم، مدفوع رنگی، زردی پوست و چشم

بی حالی شدید

گیجی مفرط

خونریزی بدون علت

تنگی نفس، افزایش وزن ناگهانی و ادم دست و پا

سختی در کنترل حرکات بدن

داشتن علائم عفونت مانند گلو درد و تب (به دلیل

عارضه نادر ولی مهم کاهش تعداد گلبول های سفید

توسط دارو)

نکات مربوط به مصرف دارو :

در صورت فراموشی یک دوز از دارو

بلافاصله بعد از یادآوری دوز فراموش شده

استفاده شود ، اگر زمان کمی تا دوز بعدی

دارو مانده است دوز فراموش شده را

استفاده نکرده و دوز بعدی طبق برنامه

استفاده شود (هرگز دو دوز با هم استفاده

نشود). دارو در دمای اتاق ، به دور از نور و

رطوبت نگه داری شود.



مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

آموزش به بیمار داروی متیل دوپا



گروه هدف: بیماران مرکز

تهیه کننده: دکتر الناز شاسب، داروساز بالینی

ویراستار: اصغری خاتونی، سوپروایزر سلامت

واحد آموزش سلامت بیمار، خانواده

تدوین: زمستان ۱۳۹۹

بازنگری: زمستان ۱۴۰۰



جزوات آموزش به بیمار به آدرس زیر

<https://alzahrahosp.tbzmed.ac.ir/>

منوی آموزش به بیمار، قابل دسترسی است

