



# داروهای کراسکار د

بخش زایمان بیمارستان الزهرا

تهیه کننده:

نگین جلیل نژاد

اندیکاسیون ها: تشنج کلونیک-تونیک-درد نورسیتیک-دیس ریتمی های بطنی که به درمان با لیدوکائین پاسخ نداده اند

کنتراندیکاسیون ها: برادیکاردی سینوسی-بلوک سینوسی-دهلیزی

عوارض: لکنت زبان-سرگیجه-پرش های عصبی-فیبریلاسیون بطنی-نیست گموس-دوبینی

**فئوبارینال:** ضد تشنج-آرامبخش-گروه حاملگی D

اندیکاسیون ها: تمام انواع اپی لپسی به جز تشنج-ابسنس-آرامبخش-بیخوابی-هیپر بیلی روبینمی-کلستازمزن

کنتراندیکاسیون ها: برونکوپنومونی-استانوس اسسماتیکوس-بیماری های شدید ربوی-بیماران دچار افسردگی همراه با افکار خودکشی

عوارض: کنارژی-ورتیگو-سردرد-دپرسیون CNS-تحریک پذیری-میوز-درد اپی گاستر-یبوست-دپرسیون تنفسی-برونکو اسپاسم

**هالوپریدول:** ضد سایکوز-گروه حاملگی C

اندیکاسیون ها: اختلالات سایکوتیک-توهم-بیماران سایکوتیک که نیاز به درمان طولانی مدت دارند

کنتراندیکاسیون ها: دیس کرازهای خونی-دپرسیون مغز استخوان-ضایعات مغزی-دپرسیون CNS-کلاپس عروقی-بیماری های عروقی-مغزی

عوارض: سندرم نورولپتیتیک بدخیم-اسیستول-احتباس ادراری-ژنیکوماستی-هیپرمنوره-مهارانزال

**دیفن هیدرامین:** آرامبخش-خواب آور-ضد سرفه-گروه حاملگی B

اندیکاسیون ها: سرفه-بیماری های حرکت یا سرگیجه-بیخوابی-کنترل حرکات دیس کینتیک

کنتراندیکاسیون ها: آسم-مصرف همزمان با مهارکننده های منوآمین اکسیداز

عوارض: خواب آلودگی-آرامبخش بیش از حد-تب-آناکسی-بی اشتها-لکوپنی

**هیدروکورتیزون:** جایگزین ادرنوکورتیکوئید-ضد التهاب استروئیدی-سایرس کننده ایمنی-گروه حاملگی C

اندیکاسیون ها: التهاب شدید-نارسایی ادرنال-شوک تهدید کننده ی حیات

کنتراندیکاسیون ها: عفونت قارچی سیستمیک-زخم های دستگاه گوارش-حساسیت مفرط

عوارض: سرخوشی-بیخوابی-تاخیر در بهبود زخم-کاتاراکت

**متوکلورامید:** ضد استفراغ-گروه حاملگی B

اندیکاسیون ها: جلوگیری و کاهش تهوع و استفراغ ناشی از سیس پلاتین و سایر ترکیبات شیمی درمانی

کنتراندیکاسیون ها: برادیکاردی سینوسی-بلوک قلبی-شوک کاردیوژنیک-نارسایی قلبی ربوی

عوارض: بیقراری-اضطراب-راش-ترشح پرولاکتین

**منیزوم سولفات:** ضد تشنج-گروه حاملگی B

اندیکاسیون ها: کنترل سریع تشنج های خطرناک-در درمان پره اکلامپسی و اکلامپسی

کنتراندیکاسیون ها: بلوک قلبی-انوری-دردهای فعال زایمان

عوارض: آریتمی-هیپوناتسمیون-کاهش تعداد تنفس-فلج

**آ.اس.آ. جویندی:** ضد درد-غیرمخدر-ضدتب-التهاب-گروه حاملگی C

اندیکاسیون ها: آرتریت-درد خفیف و تب-اختلالات ترومبومبولیک-کاهش ریسک حمله قلبی

کنتراندیکاسیون ها: کودکان و نوجوانان مبتلا به آبله مرغان-بیماران مبتلا به آسم-پولیپ بینی و کپهر مزمن-بیماران مبتلا به زخم سبتیک

عوارض: راش-سوزش-وزوز-دیسترس GI-انمی-همولیز-افزایش زمان سیلان خون

**رانیتیدین:** ضد زخم پپتیک-گروه حاملگی B

اندیکاسیون ها: زخم معده و دئودنوم-شرایط پاتولوژیک همراه با افزایش ترشحات معده-درمان نگهدارنده در زخم دئودنوم-تنظیم دوزاژ

کنتراندیکاسیون ها: آلرژی نسبت به این دارو

عوارض: راش-ضعف-سرگیجه-لکوپنی-ترومبوسیتوپنی-سوزش و خارش در محل تزریق

**اپی نفرین**: طبقه بندی ادرنژریک-گروه حاملگی C طبقه بندی درمانی:گشادکننده ی برونشها-افزایش دهنده ی فشار خون-محرک قلبی

اندیکاسیون ها:انافیلاکسی شدید یا آسم-برونکودیلاتور-برگشت ریتم قلب در ایست قلبی-طولانی کردن اثر داروهای بی حس کننده ی موضعی

کنتراندیکاسیون ها:دپرسیون مغز استخوان-اختلال عملکرد قلب-مصرف دوکسوروبیسین

عوارض ناخواسته:الویسی-اسهال-استفراغ-تهوع

**آمبودارون**: طبقه بندی درمانی:ضدارینمی های بطنی و فوق بطنی -گروه حاملگی D

اندیکاسیون ها: دیس ریتمی های بطنی -اریتمی های فوق بطنی

کنتراندیکاسیون ها: برادیکاردی همراه با سنکوب-دوران بارداری و شیردهی-بلوک درجه ۲و۳ گره ی دهلیزی بطنی

موارد احتیاط: اختلالات تیروئید-بیماری های شدید کبدی-کلیوی-کودکان-هایپوکالمی

عواض جانبی:نوروباتی محیطی-برادیکاردی -هایپوتانسیون-اسیستول-بلوک قلبی-اختلالات بینایی-هایپوتیروئیدیسم و هیپر تیروئیدیسم -

استفراغ-بیبوست-صدمه کبدی-فیبروزریوی

**لیدوکائین**: گروه حاملگی B طبقه بندی درمانی: بی حس کننده موضعی -مخاطی

اندیکاسیون ها: بی حسی های موضعی در اختلالات خفیف پوستی-قبل از انجام معاینات و اقدامات پزشکی-تسکین درد لته و مخاط دهان

لیدوکابین :ضد اریتمی بطنی HCL

کلسیم گلوکونات: گروه حاملگی C – طبقه بندی درمانی: داروی کمکی در تعادل الکترولیتها

اندیکاسیون ها: درمان اورژانسی هیپوکلسمی-هیپرکالمی-هیپرمنیزیمی-در خلال انتقال خون

کنتراندیکاسیون ها:سنگ کلیه-سارکوئیدوز-هیپرکلسمی

موارد احتیاط:بیماری های قلبی-نارسایی کلیه-اختلال شدید عملکرد دستگاه تنفس

عوارض ناخواسته:سوزن سوزن شدن-سنکوب-برادیکاردی-ایست قلبی-طعم فلزی در دهان-فلبیت

**لابتالول**: گروه حاملگی C – طبقه بندی درمانی:درمان فشار خون خفیف و شدید و شرایط اورژانسی هایپر تنشن

اندیکاسیون:فشار خون بالا

کنتراندیکاسیون ها:برادیکاردی سینوسی-بلاک قلبی-نارسایی قلبی جبران نشده

عوارض ناخواسته:گیجی-سررد-ادم-افت فشار خون-خارش سر-تنگی نفس-احتقان بینی

**نالوکسان**: گروه حاملگی B – طبقه بندی درمانی ؛انئاگونیست نارکوتیک ها

اندیکاسیون ها:دپرسیون تنفسی ناشی از مصرف نارکوتیک ها-اسیفکسی نئوناتوروم-دپرسیون ناشی از نارکوتیک ها بعد از عمل جراحی

کنتراندیکاسیون ها:حساسیت مفرط به دارو-دوران حاملگی و زایمان-سابقه ی تشنج-بیماران مسن و ناتوان

عوارض جانبی:تاکیکاردی-افزایش فشار خون-ترمور-تعریق-ادم ریوی

**آتروپین** : ضد آریتمی-گروه حاملگیC

اندیکاسیون ها: برادی کاردی-برادی آریتمی

کنتراندیکاسیون ها:گلوگوم با زاویه ی بسته-خونریزی حاد

عوارض:سر درد-بیقراری-توهم-تیرگی دید

**آدنوزین**: ضدآریتمی- گروه حاملگیC

اندیکاسیون ها:تبدیل تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال به ریتم سینوسی

کنتراندیکاسیون ها:بلوک قلبی درجه ۲و۳-فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی

عوارض: اختلال بینایی-احساس فشار در قفسه ی سینه-تنگی نفس

**فیتروگلیسرین**: ضدآنژین-گشادکننده ی عروق-گروه حاملگی C

اندیکاسیون ها: پروفیلاکسی در کفایل حملات مزمن آنژین-کاهش درد در آنژین صدری حاد-هایپر تانسیون

کنتراندیکاسیون ها: خونریزی مغزی-انمی شدید-پریکاردیت فشارنده و تامپوناد

عوارض جانبی: سوزش،یرزیبان-سر درد-سرگیجه-طیش قلب-غش

**دوبوتامین**: داروی اینوپروتیک –گروه حاملگی B

اندیکاسیون ها:افزایش برون ده قلب در درمان کوتاه مدت نارسایی جبرانی قلب به دنبال کاهش قدرت انقباضی

کنتراندیکاسیون :انفارکتوس میوکارد-خساسیت مفرط به دارو

عوارض: افزایش ضربان قلب-آنژین-درد قفسه ی سینه-کرامپ های خفیف پا

**دوبیامین**: تنگ کننده ی عروقی-گروه حاملگیC

اندیکاسیون ها:درمان کمکی در شوک برای افزایش برون ده قلب-فشارخون و جریان ادرار

کنتراندیکاسیون ها:تاکی آریتمی های اصلاح نشده-فیبریلاسیون بطنی-آسم-سابقه ی بیماری های انسدادی عروق

عوارض:ضربانات قلبی اکتوپیک-آنژین-تهش قلب-اختلالات هدایتی قلب -سر درد-تهوع-استفراغ

**دیگوکسین**: ضدآریتمی-گروه حاملگی C

اندیکاسیون ها:نارسایی اختقانی قلب-تاکیکاردی پاروکسیسمال دهلیزی

کنتراندیکاسیون ها:مسمومیت-فیبریلاسیون بطنی

عوارض:خستگی-توهم-سر درد-استنوبور-دیس ریتمی های قلبی-دوبینی

**وراپاقل**: ضدآنژین-ضدآریتمی-ضدهایپر تانسیون-گروه حاملگی C

اندیکاسیون ها:هیپر تانسیون-آنژین صدری ثابت-تاکی آریتمی های فوق بطنی

کنتراندیمکاسیون ها:برادی کاردی سینوسی-جلوک پیشرفته ی قلبی-نارسایی اختقانی قلب

هپارین سدیم:ضدانعقاد-گروه حاملگی C

اندیکاسیون ها: ترومبوز وریدی عمقی-آمبولی ریه-پروفیلاکسی آمبولیسم بعد از MI-جراحی قلب باز-انعقاد منتشر داخل عروقی-آنژین صدری

ناپایدار

کنتراندیکاسیون ها: خونریزی فعال-استعداد به خونریزی-احتمنال خونریزی داخل مغزی-در خلال یا بعد از جراحی های مغز و نخاع و چشم

عوارض:خونریزی-طولانی شدن CT-ترومبوسیتوپنی-درد خفیف-خارش

**فوروزهاید**: ضدهایپر تانسیون-گروه حاملگی C

اندیکاسیون ها:ادم حاد ریوی-ادم-هیپر کلسمی-هیپر تانسیون-نارسایی حاد کلیه-نارسایی مزمن کلیه

کنتراندیکاسیون ها:آتوری-کمای هپاتیک-سیروز کبدی و آسیت

عوارض:کاهش حجم و دهیدراتاسیون-درماتیت-درد شکم-آگرانولوسیتوز

**میدازولام**: ضداضطراب-آرامبخش گروه C

اندیکاسیون ها: جلوگیری از اضطراب قبل از عمل جراحی

کنتراندیکاسیون ها:هیپوتانسیون و شوک-نارسایی اختقانی قلب-اختلال شدید عملکرد کبد و کلیه-گلوکوم

عوارض:کهبیر-تاکیکاردی-افزایش ترشح بزاق-ناری دید

**لورازپام**: خواب آور-ضداضطراب-آرامبخش-گروه حاملگی D

اندیکاسیون ها:اضطراب-آژینتانسیون-بیخوابی-استاتوس ایپ لبتیکوس

کنتراندیکاسیون ها:گلوکوم حاد زاویه ی باریک -کما-مسمومیت حاد با الکل

عوارض:افسردگی-خواب آلودگی-کلاپس عروقی-برادیکردی-دوبینی-خشکی دهان

**فنی توئین**: ضد تشنج-گروه حاملگی D