

## داروهای با هشدار بالا



تهیه و تنظیم: سمیه نوحی

کارشناس پرستاری شاغل در بخش حاملگی پرخطر

مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

تابستان ۱۴۰۰

فهرست ۱۲ قلم داروی با هشدار بالا، مشمول الصاق برچسب گذاری روی هر

## آمپول یا ویال فرآورده تزریقی

نام دارو	ردیف	نام دارو	ردیف
آتروپین	۷	کلرید پتاسیم	۱
اپی نفرین	۸	سولفات منیزیوم	۲
هیپارین سدیم	۹	بیکربنات سدیم	۳
رتپلاز	۱۰	گلوکونات کلسیم	۴
هالوپریدول	۱۱	هایپرسالین	۵
پروپرانولول	۱۲	لیدوکائین	۶

۱۲ داروی فوق ، دارای بیشترین عوارض جدی ناشی از اشتباه داروپزشکی در بیمارستانهای سراسر کشور هستند.

## احتیاطات عمومی

- ✓ ویال کلرید پتاسیم و فسفات پتاسیم را دور از سایر دارو ها و در جایگاه مجزایی نگه دارید.
- ✓ ویال های انسولین و هیپارین در محفظه های مجزا و دور از یکدیگر جای دهید.
- ✓ تمامی داروهای وریدی ضد انعقادی را منحصر در صورتی انبار نمایید که دارای برچسب دقیق مشخصات دارو باشد .
- ✓ دسترسی به محلول های کلرید سدیم با غلظت بیش از 9/ درصد را محدود نمایید.
- ✓ در تمامی موارد جهت تجویز محلول های الکترولیتی با غلظت بالا از چک دو گانه استفاده نمایید .
- ✓ دستور پزشک را چک دو گانه تایید نمایید تا دستور دوز صحیح دارو تایید شود .
- ✓ در تترالی اورژانس با زدن برچسب قرمز رنگ " داروهای با هشدار بالا " توجه کاربران را به خطر بالقوه این داروها جلب نمایید

## لیست داروهای با هشدار بالا

برخی از داروهای با هشدار بالا به شرح زیر می باشد:

- ✓ داروهای شیمی درمانی
- ✓ انفوزیون هپارین
- ✓ انفوزیون آرگاتروبان
- ✓ انسولین (انفوزیون مستمر و تزریق زیرجلدی)
- ✓ نارکوتیک ها

**قبل از تجویز داروهای با هشدار بالا به بیماران  
چک مستقل دوگانه الزامی است**

## داروهای پرخطر

لیست داروهای پرخطر توسط کمیته های دارویی و درمانی مرکز و زی ر نظر کارشناس ایمنی مرکز بطور سالانه بازنگری شده و در اختیار بخشهای بالینی قرار می گیرد. این لیست در اتاق کار و در معرض دید تمام پرسنل درمانی بخش قرار می گیرد. در حال حاضر ۸۶ دارو در مرکز ما بعنوان داروهای پرخطر معرفی شده اند.

**الصاق برجسب قرمز داروهای پرخطر فقط روی باکس دارو**

**الصاق برجسب قرمز داروهای با هشدار بالا روی خود دارو و باکس دارو**

## مقدمه

زمانی که داروهای هشدار بالا به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرند، باعث مرگ یا آسیب شدید بیماران می شوند

## احتیاطات

- ✓ به کارگیری استراتژی هایی نظیر بهبود دسترسی به اطلاعات دارویی مرتبط به داروهای با هشدار بالا
- ✓ ممنوعیت دسترسی آزاد به داروهای با هشدار بالا
- ✓ روی باکس داروهای با هشدار بالا، نام دارو به زبان فارسی با فونت حداقل ۴۸ که از دور قابل خواندن باشد، الصاق شود
- ✓ در هنگام نسخه نویسی و نسخه برداری داروهای با هشدار بالا که دارای اسامی مشابه می باشند، حتما به منظور تأکید بر روی اختلاف اسامی دارویی، استفاده شود.
- ✓ محدودیت در تجویز داروهای با هشدار بالا به صورت شفاهی یا تلفنی
- ✓ نسخه نویسی داروهای با هشدار بالا توسط پزشک متخصص ( و بالاتر )
- ✓ استفاده از حروف درشت جهت نوشتن نام دارو در هنگام دستوردارویی
- ✓ اتصال تجویز دارو ها به سیستم های هشدار اتوماتیک در زمان بروز خطای دارویی
- ✓ استفاده از برجسب هشدار دهنده به منظور جلب نظر کاربران در هنگام تجویز داروهای با هشدار بالا
- ✓ استاندارد سازی ودقت بسیار در هنگام انبار داری، نسخه نویسی، نسخه برداری، آماده سازی و تجویز داروهای با هشدار بالا
- ✓ تجویز و آماده سازی داروهای با هشدار بالا توسط دو نفر از کادر حرفه ای به صورت مستقل از یکدیگر

