

## متیل دوپا

### موارد منع مصرف:

- حساسیت شدید به متیل دوپا
- اختلال شدید در کبد
- مصرف هم‌زمان داروهای مهارکننده مونو آمینو اکسیداز

### مکانیسم متیل دوپا عبارت است از:

- عملکرد متیل دوپا به نحوی است که یکی از متابولیت های متیل دوپا گیرنده های مهارکننده مرکزی آلفا-آدرنرژیک را تحريك و مقاومت عروق محیطی را کاهش می دهد.

### موارد احتیاط:

- مصرف هم‌زمان سایر داروهای ضد فشار خون و یا دیورتیک ها
- نارسایی کلیوی
- شیردهی

### تداخلات متیل دوپا عبارت است از:

- مصرف متیل دوپا هم‌زمان با سایر داروهای ضد فشار خون، افت فشار خون را تشدید می کند.
- مصرف متیل دوپا هم‌زمان با لیتیم احتمال بروز مسمومیت با لیتیم را افزایش می دهد.
- مصرف متیل دوپا هم‌زمان با فنتیازین ها خطر افت فشار را افزایش می دهد.

### عواض متیل دوپا عبارت است از:

- سردرد، سرگیجه، ضعف، افسردگی، کابوس های شبانه، پارکینسونیسم، اختلالات روانی

### گروه دارویی- درمانی:

- ضد آدرنرژیک با اثرات مرکزی
- ضد فشار خون بالا

### طبقه بندی در بارداری:

- گروه B

### اشکال دارویی:

- قرص روکش دار 250: میلی گرم

### موارد مصرف، روش و دوزاژ:

- هایپرتانسیون (فشار خون بالا)

**بالغین:** متیل دوپا ۲۵۰ میلی گرم روزانه ۲ تا ۳ بار به مدت ۴۸ ساعت تعجیز می گردد. سپس بر حسب نیاز می توان دوز متیل دوپا یا به عبارتی مقدار مصرف متیل دوپا را تدریجاً افزایش داد.

**کودکان:** ۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم متیل دوپا روزانه ۲ تا ۴ بار تعجیز می گردد. حداکثر دوز متیل دوپا به طور روزانه ۶۵ میلی گرم بر کیلو گرم می باشد.


### نکات با اهمیت:

- خواص متیل دوپا مشابه با کلونیدین است.
- Aldomet معروف ترین نام تجاری متیل دوپا می باشد.
- متیل دوپا از داروهای مجاز فشار خون در بارداری محسوب می شود.
- مقدار مصرف متیل دوپا در بارداری باید توسط پزشک تعیین شود.
- ساختار متیل دوپا به گونه ای است که آن را در آب محلول می سازد و نوعی پودر بی بو و سفید رنگ می باشد.
- کاهش ضربان قلب، تب، گیجی، احساس تنگی نفس، تورم در دست ها و عدم کنترل بر حرکت ماهیچه ها به عنوان عارضه متیل دوپا شناخته می شود.

- در صورت مصرف متیل دوپا هم‌زمان با مکمل فروس سولفات، فروس گلوكونات و لیتیم پزشک را در جریان قرار دهید.



## متیل دوپا



شبیم طهماسبی مسئول آموزش به بیمار بخش اورژانس

زیر نظر کارگروه آموزش به بیمار بخش اورژانس

تدوین: بهار ۹۹، بازنگری: پاییز ۱۴۰۱

- دوز متیل دوپا و نحوه مصرف قرص فشار خون متیل دوپا توسط پزشک تعیین می شود و باید مطابق با دستورات او استفاده شود.
- از مصرف الكل همزمان با متیل دوپا اجتناب کنید.
- در طول درمان با متیل دوپا از انعام کارهایی که به هوشیاری بالا نیاز دارند اجتناب کنید.
- متیل دوپا باید مطابق با دستورات پزشک استفاده شود.
- از قطع ناگهانی متیل دوپا اجتناب کنید.
- در طول مصرف متیل دوپا به دلیل احتمال بروز افت فشار وضعیتی از تغییر وضعیت ناگهانی اجتناب کنید.
- در طول درمان با متیل دوپا از مصرف بیش از حد چای و قهوه اجتناب کنید.
- در طول درمان با متیل دوپا، در صورت بروز علائم عنوان شده فوراً به پزشک مراجعه کنید: تب، گلودرده، تورم دست و پا، زخم های دهانی، بی نظمی ضربان قلب، درد قفسه سینه، تعریق، دهیدراتاسیون، اسهال و استفراغ.

### شرایط نگهداری دارو:

- متیل دوپا باید در ظرف بسته و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگاهداری شود.

منع: داروهای ژنریک ایران

- تهوع، استفراغ، اسهال، خشکی دهان، پانکراتیت، ادم، برادیکاردی، افت فشار خون وضعیتی، میوکاردیت، ایسکمی احتقان بینی، راش جلدی، نکروز کبدی، هپاتیت، آمنوره، ناتوانی جنسی، آنمی همولیتیک، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، تب، راش پوستی

### صرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف متیل دوپا در دوران بارداری: مطالعات حیوانی در مورد ارتباط بین متیل دوپا و بارداری تاثیراتی مبنی بر تراتوژنیک بودن را نشان نداده است. عوارض قرص متیل دوپا بر جنین انسان چندان شدید نمی باشد بنابراین مصرف متیل دوپا در بارداری می تواند گزینه مناسبی باشد اما دوز مصرف متیل دوپا در بارداری باید توسط پزشک تعیین شود.

- مصرف متیل دوپا در دوران شیردهی: اگرچه متیل دوپا در شیر انسان ترشح می شود اما احتمال بروز عوارض متیل دوپا بر نوزادان شیرخوار بعید است اما با این حال بهتر است متیل دوپا در شیردهی با احتیاط مصرف شود.

### توجهات بیمار - خانواده: