

"بسمه تعالی"

داروهای ترالی احیا



KALADERM

گرد آورنده:

لیلا اسد زاده لاله

بیمارستان آموزش درمانی الزهرا (س)

ایه، نفرین

موارد مصرفی اپی نفرین ۱:۱۰۰۰ شوک آنا فیلاکسی ، واکنش های آلرژیک برونکواسپاسم برگشت پذیر ناشی از آسم آمفیز م و برونشیت مزمن

موارد مصرف اپی نفرین ۱:۱۰۰۰۰ ایست قلبی شامل ریتم های آسیستول ، ایست قلبی شامل ریتم های آسیستول ، فعالیت الکتریکی بدون نبض، فیبر یلاوسیون بطنی بدون نبض بعد از دادن شوک اول یا دوم و برادی کاردی علامت دار

آتروپین سولفات: ۰/۵ mg

موارد مصرف: در بیماریهای میوکارد افزایش تون پاراسمپاتیک می تواند موجب اختلال در هدایت و یا آسیستول گردد آتروپین به عنوان درمان اولیه برادی کاردی علامت دار استفاده می شود.

دوز پیشنهادی: ۰/۵ mg وریدی است که در صورت لزوم تا سقف ۳mg هر ۳-۵ دقیقه تکرار می شود.

آمیو دارون ۱۵۰mg/۳ml

موارد مصرف : vt و vf بدون نبض در vt و vf بدون نبض بعد از شوک سوم به صورت ۳۰۰mg وریدی یا داخل استخوانی به صورت بلوس و در صورت عدم پاسخ ۱۵۰mg تکرار میشود .

و در سایر موارد ابتدا ۱۵۰mg در عرض ۱۰ دقیقه و به دنبال آن انفوزیون ۱mg/min برای ۶ ساعت و سپس ۰/۵ mg/min برای ۱۸h به عنوان دوز نگهدارنده تا سقف دو در ۲.۲gr در ۲۴h داده میشود.

ادتوزین: ۶mgper۳ml

موارد مصرف:

تبدیل psvt به ریتم سینوسی دوز اولیه ۶mg به صورت تزریق سریع وریدی ظرف ۲-۱۰ ثانیه اگر در آریتمی در طی یک تا دو دقیقه بهبود پیدا نکرد در صورت نیاز ۱۲mg دیگر تجویز می شود.

دویابین : ۲۰۰ mg/۵ ml

موارد مصرف: این دارو در هایپوتانسیون شدید و در غیاب هیپوولمی مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو بلافاصله بعد از CPR، جهت حفظ گردش خون مغز، می توان از مقادیر بالای دویابین استفاده کرد.

دوبوتامین: ۲۵۰ mg

موارد مصرف در درمان بیماران با احتقان ریوی و برون ده قلبی پایین و در بیماران هایپرتانسیون با احتقان ریوی استفاده می شود.

لاتبالول: ۱۰۰ mg/۲۰ ml

موارد مصرف : در درمان پرفشاری خون متوسط تا شدید ، کنترل پرا کلاسی ، پرفشاری شدید در حاملگی استفاده می شود.

تیترو گلیسرین ۱۰ mg/۲ ml ۱۰ mg/ml

موارد مصرف کننده : گشاد کننده عروقی قوی ضد ایسکمی و ضد فشارخون و در بحران هایپرتانسیون انفارکتوس میوکارد استفاده می شود.

بی کربنات سدیم:

موارد مصرف: در اسیدوز متابولیک شدید مسمومیت با ضد افسردگی سه حلقه ای هیپرکالمی و داروی کمکی درامیا قلبی ریوی بی کربنات سدیم در ابتدا ۱mg/kg به صورت انفوزیون وریدی استفاده می شود و برای جلوگیری از عوارض حتماً ABG چک شده و بر اساس ABG محاسبه دوز انجام می شود.

سولفات منیزیم :

موارد مصرف : در کنترل تشنج های خطرناک در پره اکلاسی و اکلاسی به عنوان شل کننده رحمی در درمان تثنای رحم استفاده می شود.

این دوره باید با پمپ انفوزیون مصرف شود اما زیان سریع موجب سازی گرما می شود نکته دستور تکرار مصرف دارو حتما رفلکس حرکتی زانو باید آزموده شود و املاح کلسیم باید برای تزریق بریده است باشد

این دارو باید با پمپ انفوزیون مصرف شود انفوزیون سریع موجب احساس گرما می شود. نکته در صورت تکرار مصرف دارو حتما رفلکس حرکتی زانو باید آزموده شود و املاح کلسیم باید برای تزریق وریدی در دسترس باشد.

دیگوکسین : ۰/۵ MG/۲ ML

مواد مصرف نارسایی احتقانی قلب و تاکیکاردی دهلیزی

نکته : قبل از دادن دارو یک دقیقه نبض اپیکال را کنترل نمایید و در صورتیکه نبض کمتر از ۶۰ در دقیقه باشد به پزشک اطلاع داده و به تعداد و ریتم نبض توجه نمایید .

ورایامیل : ۵ MG/۲ ML

موارد مصرف تاکی آریتمی فوق بطنی و آنژین پایدار مزمن و غیر پایدار استفاده می شود.