



داروهای کراشکارت



مرکز آموزشی درمانی الزهراء تبریز

تهیه کنندگان: عاطفه شکوری - الهام فتح اللهی

زمستان ۱۴۰۰

منابع: داروشناسی کاربردی بالینی برای پرستاران

کنتراندیکاسیون ها: آسم-مصرف همزمان با مهارکننده های منوآمین اکسیداز
عوارض: خواب آلودگی-آرامبخش بیش از حد-تب-آتاکسی-بی اشتیاهی-لکوپنی

هیدروکورتیزون : گروه C

اندیکاسیون ها: جایگزین ادرنوکورتیکوئید-ضدالتهاب استروئیدی-سپرس کننده ایمنی-التهاب شدید-نارسایی ادرنال-شوک تهدید کننده ی حیات
کنتراندیکاسیون ها: عفونت قارچی سیستمیک-زخم های دستگاه گوارش-حساسیت مفرط
عوارض: سرخوشی-بیخوابی-تاخیر در بهبود زخم-کاتاراکت

متوکلوپرامید : گروه B

اندیکاسیون ها: ضداستفراغ-جلوگیری و کاهش تهوع و استفراغ ناشی از سیس پلاتین و سایر ترکیبات شیمی درمانی
کنتراندیکاسیون ها: برادیکاردی سینوسی-بلوک قلبی-شوک کاردیوژنیک-نارسایی قلبی ریوی
عوارض: بیقراری-اضطراب-راش-ترشح پرولاکتین

منیزیم سولفات : گروه B

اندیکاسیون ها: ضدتشنج-کنترل سریع تشنج های خطرناک-درمان پره اکلامپسی و اکلامپسی
کنتراندیکاسیون ها: بلوک قلبی-انوری-دردهای فعال زایمان

قرص کلوپیدوگرل : گروه B

اندیکاسیون ها: جایگزین آسپرین به صورت پروفیلاکسی
کنتراندیکاسیون: فشار خون بالا-طپش قلب

دیگوکسین: گروه C

اندیکاسیون ها: ضدآریتمی - نارسایی اختقانی قلب-تاکیکاردی پاروکسیسمال دهلیزی
کنتراندیکاسیون ها: مسمومیت-فیبریلاسیون بطنی

وراپیل : گروه C

اندیکاسیون ها: ضدآنژین-ضدآریتمی-ضدهایپرتانسسیون
هیپرتانسسیون-آنژین صدری ثابت-تاکی آریتمی های فوق بطنی
کنتراندیکاسیون ها: برادری کاردی سینوسی-بلوک پیشرفته قلبی-نارسایی اختقانی قلب

هپارین سدیم: گروه C

اندیکاسیون ها: ضدانعقاد- ترومبوز وریدی عمقی-آمبولی ریه-پروفیلاکسی آمبولیسم بعد از MI جراحی قلب باز-انعقاد منتشر داخل عروقی-آنژین صدری ناپایدار
کنتراندیکاسیون ها: خونریزی فعال-استعداد به خونریزی-احتمال خونریزی داخل مغزی-درخلال یا بعد از جراحی های مغز و نخاع و چشم

فوروزامید: گروه C

اندیکاسیون ها: ضدهایپرتانسسیون - ادم حاد ریوی-ادم-هیپیرکسمی-هیپرتانسسیون-نارسایی حاد کلیه-نارسایی مزمن کلیه
کنتراندیکاسیون ها: انوری-کمای هپاتیک-سیروز کبدی و آسیت

میدازولام : گروه C

اندیکاسیون ها: ضداضطراب-آرامبخش - جلوگیری از اضطراب قبل از عمل جراحی
کنتراندیکاسیون ها: هیپوتانسسیون و شوک-نارسایی اختقانی قلب-اختلال شدید عملکرد کبد و کلیه-گلوکوم

دیفن هیدرامین: گروه B

اندیکاسیون ها: آرامبخش-خواب آور-ضدسرفه-سرفه-بیماری های حرکت یا سرگیجه-بیخوابی-کنترل حرکات دیسکینتیک

ابی نفرین: گروه C

اندیکاسیون ها: گشادکننده ی برونشها- افزایش دهنده فشار خون- محرک قلبی- انافیلاکسی شدید یا آسم - برونکودیلاتور- برگشت ریتم قلب در ایست قلبی- طولانی کردن اثر داروهای بی حس کننده ی موضعی

کنتراندیکاسیون ها: دپرسیون مغز استخوان- اختلال عملکرد قلب- مصرف دوکسوروبیسین

آمیودارون: گروه D

اندیکاسیون ها: ضداریتمی های بطنی و فوق بطنی- دیس ریتمی های بطنی- اریتمی های فوق بطنی
کنتراندیکاسیون ها: برادیکاردی همراه با سنکوپ- دوران بارداری و شیردهی- بلوک درجه ۲ و ۳ گره ی دهلیزی بطنی

لیدوکائین: گروه B

اندیکاسیون ها: بی حس کننده موضعی- مخاطی- بی حسی های موضعی در اختلالات خفیف پوستی- قبل از انجام معاینات و اقدامات پزشکی- تسکین درد لثه و مخاط دهان- ضد اریتمی بطنی HCL

کلسیم گلوکونات: گروه C

اندیکاسیون ها: داروی کمکی در تعادل الکترولیتها- درمان اورژانسی هیپوکلسیمی- هیپرکالم- هیپرمنیزیمی- در خلال انتقال خون

کنتراندیکاسیون ها: سنگ کلیه- سارکوئیدوز- هیپرکلسیمی

آدنوزین: گروه C

اندیکاسیون ها: ضداریتمی - تبدیل تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال به ریتم سینوسی
کنتراندیکاسیون ها: بلوک قلبی درجه ۲ و ۳ - فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی

نالوکسان: گروه B

اندیکاسیون ها: انتاگونیست ناركوتیک ها- دپرسیون تنفسی ناشی از مصرف ناركوتیک ها-اسیفکسی نفوناتوروم-دپرسیون ناشی از ناركوتیک ها بعد از عمل جراحی

کنتراندیکاسیون ها: حساسیت مفرط به دارو- دوران حاملگی و زایمان- سابقه ی تشنج-بیماران مسن و ناتوان

آتروپین: گروه C

اندیکاسیون ها: برادی کاردی-برادی آریتمی- ضد آریتمی- گلوگوم با زاویه ی بسته-خونریزی حاد
کنتراندیکاسیون ها: تاکی آریتمی های اصلاح نشده-فیبریلاسیون بطنی-آسم-سابقه بیماری های انسدادی عروق

لورازپام: گروه D

اندیکاسیون ها: خواب آور-ضداضطراب-آرامبخش - اضطراب- کنتراندیکاسیون ها: گلوگوم حاد زاویه ی باریک- کما-مسمومیت حاد با الکل

نیتروگلیسیرین: گروه C

اندیکاسیون ها: ضد آنژین- گشادکننده ی عروق- پروفیلاکسی در مقابل حملات مزمن آنژین- کاهش درد در آنژین صدری حاد- هایپر تانسیون

کنتراندیکاسیون ها: خونریزی مغزی- انمی شدید- پریکاردیت فشارنده و تامپوناد

دوبوتامین: گروه B

اندیکاسیون ها: افزایش برون ده قلب در درمان کوتاه مدت نارسایی جبرانی قلب به دنبال کاهش قدرت انقباضی
کنتراندیکاسیون ها: انفارکتوس میوکارد- حساسیت مفرط به دارو

آ.اس.آ جویندی: گروه C

اندیکاسیون ها: ضد درد- ضد تب - ارتزیت- اختلالات ترومبوامبولیک- کاهش ریسک حمله قلبی

کنتراندیکاسیون ها: کودکان و نوجوانان مبتلا به آبله مرغان- بیماران مبتلا به آسم یا زخم سپتیک- پولیپ- بینی و کهیر مزمن

دوپامین: گروه C

اندیکاسیون ها: تنگ کننده ی عروقی- درمان کمکی در شوک برای افزایش برون ده قلب و فشارخون و جریان ادرار
کنتراندیکاسیون ها: تاکی آریتمی های اصلاح نشده-فیبریلاسیون بطنی-آسم-سابقه بیماری های انسدادی عروق

لابتالول: گروه C

اندیکاسیون ها: درمان فشار خون خفیف و شدید و شرایط اورژانسی هایپر تانسیون
کنتراندیکاسیون ها: برادیکاردی سینوسی- بلاک قلبی- نارسایی قلبی جبران نشده

فنی توئین: گروه D

اندیکاسیون ها: ضد تشنج - تشنج کلونیک-تونیک-درد نورسیتیک- دیس ریتمی های بطنی که به درمان با لیدوکائین پاسخ نداده اند.
کنتراندیکاسیون ها: برادیکاردی سینوسی- بلوک سینوسی-دهلیزی

فنوباربتال: گروه D

اندیکاسیون ها: ضد تشنج-آرامبخش- تمام انواع اپی لپسی به جز تشنج-ابسنس-آرامبخش - بیخوابی-هیپر بیلیروبینمی-کلستاز مزمن
کنتراندیکاسیون ها: برونکوپنومونی-استاتوس اسسماتیکوس-بیماری های شدید ریوی- بیماران دچار افسردگی همراه با افکار خودکشی

هالوپریدول: گروه C

اندیکاسیون ها: ضدسایکوز - اختلالات سایکوتیک-توهم-بیماران سایکوتیک که نیاز به درمان طولانی مدت دارند.
کنتراندیکاسیون ها: دیس کرازیهای خونی-دپرسیون مغز استخوان- ضایعات مغزی-دپرسیون- CNS کلاپس عروقی-بیماری های عروقی-مغزی