

والدین گرامی

ضمن تبریک قدم نورسیده و آرزوی سلامتی و موفقیت، این بروشور به منظور آشنایی شما با فرآیند ختنه تدوین شده است.

ختنه چیست؟

ختنه عمل جراحی است که در آن پوست انتهایی پوشاننده آلت تناسلی کودک برداشته می شود. در این مرکز عمل ختنه به روش گذاشتن حلقه انجام می شود. حلقه وسیله ای است که مقداری استاندارد و تعریف شده از پوست آلت کودک را برمی دارد.

بعد از انجام ختنه باید به نکات زیر

توجه کافی داشته باشید:

۱. تا زمانی که حلقه جدا نشده است، از بستن

پوشک و همانند آن خودداری نمایید.

۲. دو روز پس از انجام ختنه می توانید نوزاد را شستشو دهید.

۳. قرمزی و تورم آلت تناسلی از اولین روز شروع شده و به تدریج تا افتادن حلقه بیشتر می شود. بعد از افتادن حلقه تورم و قرمزی آلت در عرض چند روز برطرف می گردد.

۴. افتادن حلقه به طور متوسط تا ۱۰ روز طول می کشد. در صورت نیفتادن حلقه بعد از ۱۰ روز، جهت ویزیت به این مرکز مراجعه نمایید.

۵. بعد از تمیز و خشک کردن ناحیه تناسلی، نوک آلت را هر روز ۶ بار با وازلین طبی آغشته نمایید. این کار از تنگی نوک مجرا جلوگیری کرده و بعد از افتادن حلقه نیز باید مدتی ادامه یابد.

۶. هر روز سه بار تا افتادن حلقه لایه نازکی از پماد تتراسایکلین نسخه شده را روی پوست آلت کودک بمالید.

۷. در مواقعی که کودک را به آغوش می گیرید، مراقب باشید به محل ختنه فشار وارد نشود.

۸. از محلول ها و داروهای دیگر مانند بتادین، الکل و ... نباید استفاده شود.

۹. در صورت بروز هر یک از علائم زیر بلافاصله به این مرکز مراجعه نمایید:

- ✓ خونریزی زیاد از محل ختنه
- ✓ قرمزی و تورم شدید محل عمل
- ✓ وجود ترشحات چرکی زرد رنگ
- ✓ ادرار نکردن تا ۱۲ ساعت
- ✓ تورم شدید آلت کودک



مرکز آموزشی، درمانی الزهرا (س)

مراقبتهای بعد از ختنه



کد: ALZ-PEB-112

گروه هدف: والدین نوزادان

تهیه و تنظیم: دکتر محجل حلیم

پزشک مرکز

ویراستار: اصغری خاتونی، سوپروایزر آموزش سلامت

پائیز ۱۴۰۱

۷. تنگی مجزا

۸. سایر عوارض ذکر شده در منابع مربوطه

توجه: در تعداد کمی از موارد حتی بعد از چند ماه ممکن است، آلت کودک در بافت چربی اطراف آن حالت فرورفتگی پیدا کند که نیاز به ختنه مجدد ندارد و با رشد کودک برطرف می شود.

جهت رویت مطالب علمی آموزش به بیمار و دسترسی به سامانه پاسخگوئی به سوالات بیمار پس از ترخیص به آدرس زیر، منوی آموزش به بیمار مراجعه کنید:

<https://alzahrahosp.tbzmed.ac.ir>

✓ زخم و خراشیدگی سر آلت نوزاد

✓ عقب رفتن حلقه بر روی آلت کودک، گیر

افتادن و تورم شدید آن به نحوی که کل

سر آلت از حلقه بیرون بزند و حلقه روی

تنه آلت قرار گیرد.

۱۰. بعد از افتادن حلقه جهت انجام ویزیت به

این مرکز مراجعه نمایید.

عوارض احتمالی ختنه

ختنه می تواند دارای برخی عوارض زودرس و دیررس باشد که به مهمترین آنها اشاره می شود:

۱. خونریزی از محل عمل

۲. عفونت محل عمل

۳. حساسیت به داروها در حین عمل

۴. نیاز به تزریق خون

۵. بوجود آمدن نسج جوشگاهی در محل عمل

۶. بروز چسبندگی در پوست سر آلت